

LE DEUIL

	NORMAL	COMPLIQUE	MELANCOLIQUE	MANIAQUE	HYSTERIQUE	OBSESSIONNEL
CARACTERISTIQUES	Cs de la perte, mort, affect. Détresse, dépression, adaptation.	Pas de chronologie. L'équilibre se dégrade.		Ecllosion paradoxale	Fonction imaginaire vécue intensément. Fantasme/Identification/Conflit oedipien.	AG, ambivalence, économie de la libido.
VECU DE LA REALITE	Déni pendant quelques heures puis accepte.	Négation de l'affect douloureux.	Ics de la perte par le moi.	3/4 j puis dénégalion de l'état de deuil et du noyau dépressif.	Tente de nier la mort.	Obsession : dénégalion d'un souhait de mort. Sait que l'autre est mort mais il l'a souhaité.
TRAVAIL DE DEUIL	Possible si pleurs. Désinvestissement des souvenirs : 1 an	Blocage. Travail impossible.	Deuil de soi. Blessure narcissique.		Travail de chaque souvenir pour nier la mort de l'autre.	
RELATIONS OBJECTALES	Intér° de l'objet : séparation possible.	Intér° compliquée : identification au mort.	Le moi quitte son objet. Intér°, id° à l'objet perdu. Amour narcissique et non objectal.		Intér° de l'objet, id° nombreuses, partielles, labiles et superficielles au défunt.	Id° au défunt. Volonté de le rejoindre.
MANIFESTATIONS	Emotionnelles et somatiques.	Organiques. Déclaration de maladie.			Somatisations. Symptômes du défunt pour nier la mort.	Obsession : dénégalion d'un souhait de mort.
DEPRESSION	Permet le deuil. Humeur triste. Hostilité / aux vivants.	Importante. Culpabilité intense. Hostilité / aux vivants. Colère.	Profonde, et longue. Culpabilité. Le futur ne peut être envisagé.		Longue. Volonté de rejoindre le défunt. Culpabilité. Sentiment d'abandon. Deuil œdipien pathologique. Anorexie.	Culpabilité intense. Rêves morbides. Désir de mort.
ADAPTATION	Peut envisager l'avenir.	Relative. Pas de développement pathologique.				